

Aperçu des couleurs mediven®

medi

	tricot circulaire								tricot à plat				
	mediven elegance	mediven confort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte	mediven for men	mediven active	mediven angio	mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe	mediven esprit	mediven 550 bras
Noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
anthracite	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
Gris	○	○		○	○				○	○	○	○	○
Marine	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
medi Magenta	○			○					○	○	○	○	○
Cachemire	●	●		●	●				●	●	●	●	●
Caramel	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Sable	●	●		●	●				●	●	●	●	●
Beige	●	○		●	○								
Blanc	○			○			●						
Marron						●	●						
Jaune safran	●	●		●	●				●	●	●	●	●
Violet velours	●	●		●	●				●	●	●	●	●
Bleu clair	●	●		●	●				●	●	●	●	●
vert sauge	●	●		●	●				●	●	●	●	●

○ Couleur standard avec un délai de livraison pouvant aller jusqu'à 10 jours ouvrés.

* Couleur tendance avec un délai de livraison pouvant aller jusqu'à 10 jours ouvrés. Les couleurs tendance ne peuvent pas être échangées. Sous réserve de légères variations de couleur.

Motifs composés de cristaux scintillants






NOUVEAU

Disponible pour les modèles mediven elegance, mediven confort, mediven plus, mediven forte et pour tous les bas et manchons mediven tricotés à plat.¹

Element design ou Fashion Element pour le tricot à plat

Ces motifs peuvent être associés à toutes les couleurs classiques et tendance, et sont disponibles en version Fashion-Elements (bicolore) ou Élément design (ton sur ton).

Disponible pour les modèles mediven mondi, mediven cosy, mediven 550 (pour les jambes et les bras) et mediven esprit.



¹ à l'exception des bas de compression pour les membres inférieurs dotés d'une couture latérale.

Indications : bas de contention médicaux tricotés en rond ou à plat, destinés à la compression des membres inférieurs, principalement dans le cadre du traitement des affections du système veineux ou lymphatique. Bas de contention médicaux tricotés à plat, destinés à la compression des membres supérieurs, principalement dans le cadre du traitement des affections du système lymphatique.